Bloco 15

Expansão do MI

- **Referências**

- ❖ Spitzer – Cap. 11
- ❖ Dyson & Williams – Cap. 7
- ❖ Maciel – Cap. 11
- ❖ Scheffler & Elsässer – Seção 6.3
- ❖ Lequeux – Cap. 12 (mais atual que notas destes slides)

15-1

Processos dinâmicos no MI

- Alguns exemplos de processos no MI que necessitam de descrição dependente no tempo são:
 - ❖ interação de SN com o MI, onde a energia e o momento depositados no MI resultam da ejeção explosiva das camadas externas de uma estrela
 - ❖ expansão de regiões HII e NP
 - ❖ interação com o MI de ventos intensos de estrelas frias e quentes
 - ❖ processos de colapso e fragmentação de nuvens moleculares densas $\Rightarrow$ formação estelar
 - ❖ estrutura do MI, que se origina do conjunto dos processos acima
- Os itens sublinhados serão abordados nesta aula.

15-2

- Os dois principais eventos que contribuem para injeção de energia cinética no MI são:

- ❖ Regiões HII

- ↳ a energia do expansão é proveniente dos fótons da estrela ionizantes

- ❖ SN

- ↳ a energia neste caso provém da ejeção de matéria

15-3

Dinâmica de regiões HII

- Uma estrela O tem um tempo de vida da ordem de 10^7 anos
- O ingresso na SP de uma estrela desse tipo é da ordem de 10^4 - 5 anos. Assim, podemos considerar que o fluxo ionizante é estabelecido instantaneamente
- Na sequência principal, o gás circunvizinho é aquecido (por fotoionização e efeito fotoelétrico nos grãos) e expande-se devido à diferença de pressão introduzida
- Existem dois momentos da expansão associados a uma região HII
 1. inicialmente ocorre uma frente de ionização: fótons ionizando o material neutro
 2. com o esgotamento dos fótons, ocorre uma expansão do material ionizado devido à diferença de pressão com a região neutra em torno

15-5

Frente de ionização

- Inicialmente, vamos definir o referencial. Ele será fixo na estrela e no gás neutro. Assim, a velocidade da frente não é nula (em comparação com a abordagem de choque feita na aula anterior).

15-6

- A velocidade da frente de ionização, u_i , pode ser calculada considerando o modelo abaixo, onde $J(r)$ é igual ao número de fótons ionizantes atravessando a frente de ionização por unidade de área no raio r

15-7

- $J(r)$ pode ser calculado a partir de $Q(r)$:

fótons s^{-1}
no raio r

$$4\pi r^2 J(r) = Q(0) - \frac{4\pi}{3} r^3 \alpha n_e n_H \alpha^{(2)}$$

fótons ionizantes
emitidos pela estrela

fótons perdidos em
ionizações internas a r

- Assim, obtemos:

$$u_i = \frac{1}{n_H} J(r)$$

$$u_i(r) = \frac{Q(0)}{4\pi r^2 n_H} - \frac{1}{3} r \alpha n_e \alpha^{(2)}$$

$$\frac{dr(t)}{dt} = \frac{Q(0)}{4\pi r^2 n_H} - \frac{1}{3} r \alpha n_e \alpha^{(2)}$$

15-8

- Considerando a densidade eletrônica dentro da região ionizada igual a densidade de hidrogênio na região neutra e ionização total, a solução para $r(t)$ é dada por:

$$r_i^3(t) = r_s^3 \{ 1 - \exp(-n_H \alpha^{(2)} t) \}$$

- onde r_s é o raio de Strömngren.
 - ❖ Resultados (vide exercícios)
 - ❖ a velocidade da frente de ionização diminui com o raio, tendendo a zero no raio de Strömngren
 - ❖ a velocidade próxima de $t=0$ é da ordem de milhares de km/s, muito maior que a velocidade do som. Assim, o gás não consegue reagir a frente de ionização mudando sua densidade, por exemplo. Consequentemente, podemos considerar as densidades nos dois lados da frente iguais.

15-9

Weak-R ionization front

- O caso mais comum é o caso “rarefeito” fraco onde:
 - ❖ o fraco refere-se a solução com sinal negativo nas condições de Rankine-Hugoniot que resulta em um aumento “fraco” da densidade e velocidade na frente de ionização

- ❖ rarefeito, pois acontece em meios com densidades baixas

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = 1 + \frac{C_2^2}{u_1^2} \quad e \quad u_1 - u_2 = \frac{C_2^2}{u_1}$$

- De fato a equação deduzida para a velocidade é válida apenas no caso “weak R”. Porém isso ocorre até praticamente o momento em que a frente de expansão atinge o raio de Strömngren do primeiro momento de expansão

15-13

Frente de expansão

- Após o esgotamento dos fótons ionizantes, a pressão na região HII toma-se maior que na região neutra
 - ❖ temperatura é 100x maior na região HII
 - ❖ densidade numérica é da ordem de 2x maior
- Assim, a RHII expandirá até alcançar o equilíbrio hidrostático. Desse modo, considerando n a densidade do Hidrogênio, podemos escrever (1: início da fase; 2: final da fase)

$$P_1 = P_2 \quad \rightarrow \quad n_1 k T_1 = 2 n_2 k T_2$$

$$n_2 = \frac{T_1}{(2T_2)} n_1$$

$$r_2 = \left[\frac{2T_2}{T_1} \right]^{2/3} r_1$$

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{2T_2}{T_1}$$

A partir do Raio de Stromgren,
 $r_s \propto n_H^{-2/3}$

15-14

Propagação de envelopes de SN

- Considerando valores típicos, obtemos:

$$\frac{n_2}{n_1} = 0.005$$

$$\frac{r_2}{r_1} = 34$$

$$\frac{M_2}{M_1} = 200$$
- A expansão da região HII – que leva a uma rarefação – não altera o balanço de ionização
 - ❖ isso ocorre devido a menor eficiência de recominação, que é proporcional ao quadrado da densidade (mecanismo collisional)
- A expansão ocorre até o estabelecimento do equi. hidrostático

15-15

- Supernovas:
 - ❖ se $M_* > 8 M_\odot \rightarrow$ SN
 - ❖ a energia liberada em um evento de SN, E_{SN} , é da ordem de 10^{51} erg e divide-se em radiação e energia cinética
 - ❖ eventos explosivos onde a velocidade do material ejetado atinge valores da ordem de 10.000 km/s
 - ❖ velocidades são obviamente supersônicas e um choque ocorre
- A evolução da expansão pode ser dividida em três fases de acordo de acordo com as condições de transição no choque

15-20

Fases da SN

- Fase 1
 - ❖ velocidade da frente de expansão é constante, pois o fluxo de matéria não “sente” o material do MI
- Fase 2
 - ❖ fase adiabática
 - ↪ determinada pela quantidade de matéria do MI arrastada pela frente de choque
 - ↪ apesar do acréscimo de densidade os mecanismos de resfriamento não são eficientes e choque pode ser considerado adiabático
- Fase 3
 - ❖ fase radiativa/isotérmica: quando o resfriamento por radiação passa a ser importante

15-21

Expansão de SN: Fase 2

$$\frac{4\pi}{3} r_s^3 \rho_1 \approx M_{SN}$$

- Quando a massa comprimida do MI torna-se comparável à massa do envelope da SN ocorre uma desaceleração da expansão
- A temperatura do envelope atinge $\sim 10^7\text{-}8$ K (vide próximo slide)
 - ❖ o resfriamento ocorre por bremsstrahlung, que é um mecanismo lento. Assim, o choque pode ser considerado adiabático. Esta fase é também chamada de Fase de Sedov.
 - ❖ $E \sim cte$.

15-23

Expansão de SN: Fase 1

- Na fase inicial, a velocidade de expansão do envelope é constante, pois a massa do MI arrastada é pequena, oferecendo pouca resistência

$$\rho_{SN} \gg \rho_M = \rho_1$$

↓

matéria do MI “arrastada”

$$\frac{4\pi}{3} r_s^3 \rho_1 < M_{SN}$$

massa do envelope

- Quando a massa arrastada pelo MI aproxima-se à do envelope, a velocidade diminui e ocorre uma mudança da dinâmica. Considerando valores de $M_{SN} \sim 0.5 M_{\odot}$ e $\rho_{MI} = 2 \cdot 10^{-24} \text{g cm}^{-3}$, temos que $r_s = 1.6 \text{ pc}$ (raio da frente de expansão).

velocidade da ordem de 20.000 km/s

15-22

Resfriamento a altas temperaturas

Figure 6.6. The cooling function $A(T_e)$ for shocked interstellar gas.

Dyson & Williams

Table 6.1.

Region	Approximate temperature range	Main cooling process	Spectral region of the radiation
A → B	$5 \times 10^3 \text{ K} \lesssim T \lesssim 10^5 \text{ K}$	forbidden lines	optical; IR
B	$T \approx 10^5 \text{ K}$	H excitation/ionization resonance lines	optical; UV
B → C	$10^5 \text{ K} \lesssim T \lesssim 10^8 \text{ K}$	bremsstrahlung	far UV; soft X-ray
C onwards	$T \gtrsim 10^8 \text{ K}$		radio

15-24

Expansão da frente - DW, Sec. 7.3.3

- No caso de um choque adiabático, as energias térmica e cinética por unidade de massa podem ser consideradas iguais e dadas por:

$$E_r = E_k = \frac{9}{32} u_1^2$$

- Assim, a energia total, E, pode ser dada pela integral do valor acima dentro da esfera em expansão:

$$E_{SN} = \frac{3}{4} \pi \rho_1 r_s^3 u_1^2$$

- A equação acima possui a seguinte solução para raio e, consequentemente, para velocidade

$$r_s = \left(\frac{25}{3\pi} \right)^{1/5} \left(\frac{E_{SN}}{\rho_1} \right)^{1/5} t^{2/5} \quad e \quad u_1 = \frac{2}{5} \left(\frac{25}{3\pi} \right)^{1/5} \left(\frac{E_{SN}}{\rho_1} \right)^{1/5} t^{-3/5}$$

15-25

Densidade x raio

- Cálculos mostram que a pressão e a densidade diminuem da frente de choque para trás. Vide tabela abaixo para pressão

Table 12.1. Pressure Variation behind Adiabatic Supernova Shock Front

r/r_s	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94
p/p_2	1.000	0.926	0.860	0.802	0.751	0.706	0.666
r/r_s	0.93	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82
p/p_2	0.630	0.598	0.545	0.502	0.467	0.439	0.415
r/r_s	0.80	0.75	0.70	0.60	0.50	0.40	0
p/p_2	0.396	0.362	0.340	0.318	0.310	0.306	0.306

Spitzer

- Assim, a maior parte da massa do envelope concentra-se próxima à frente de choque
 - ❖ 0.5 M_{SN} concentra-se a 6.1% do raio final
 - ❖ 0.75 M_{SN} concentra-se a 12.6% do raio final

15-30

- Em um choque adiabático, a temperatura é dada por:

$$T_2 = \frac{3}{16} \frac{\mu m}{k} u_1^2$$

- Usando essa expressão e os resultados anteriores, obtemos:

$$r_s = \frac{0.26 [t_{ano}]^{2/5}}{n_H^{1/5}} pc$$

$$T_2 = \frac{1.5 \cdot 10^{11}}{[t_{ano}]^{6/5} n_H^{2/5}} K$$

- ❖ onde foi considerado $n_H^e/n_H = 0.10$
- Assim, a temperatura diminui com o tempo
- Do ponto de vista espacial, a temperatura aumenta com a diminuição do raio pois a frente de choque foi mais quente no passado (a raios menores, portanto)

15-29

Fase 3: Radiativa

- Com o aumento da densidade com o tempo (e com o raio), mecanismos mais eficientes de resfriamento passam a atuar e o choque não pode mais ser considerado adiabático.
- Quando T aproxima-se de 10⁶ K, a energia média do elétron cai para 100 eV. Isso ocorre tipicamente em:
 - ❖ $t \sim 2 \cdot 10^4$ anos
 - ❖ $r_s \sim 14$ pc
- Nesse caso, núcleos como C, N e O capturam elétrons e podem, então, sofrer transições. Assim, a perda de energia por radiação torna-se importante
- Assim, choque deixa de ser adiabático. Ele passa a ser mantido pelo momento da matéria do envelope, não mais por sua energia térmica

15-31

- Quando o choque entra na fase isotérmica, o momento do envelope (*shell*) em expansão permanece constante. Assim:

- ❖ $M_t u_t = M u = \text{cte.}$,

- ↳ onde: M é massa do envelope e u , sua velocidade

- ↳ as variáveis com o índice t referem-se ao início da fase 3

- Considerando que a massa do envelope é TODA a massa do MI arrastada (o que não é completamente correto), temos:

$$M = \frac{4\pi}{3} r_s^3 \rho_1$$

- E velocidade pode ser expressa como:

$$u = \frac{3 M_t u_t}{4\pi r_s^3 \rho_1}$$

15-32

- Assim, o raio e a velocidade do envelope são:

$$r_s = r_t \left[1 + 4 \frac{u_t}{r_t} (t - t_t) \right]^{1/4}$$

$$u = u_t \left[1 + 4 \frac{u_t}{r_t} (t - t_t) \right]^{-3/4}$$

- Valores típicos

- ❖ raio: 15 pc

- ❖ velocidade de expansão: 85 km/s

- ❖ idade: 40.000 anos

15-33

- Notar que a velocidade cai mais rapidamente agora:

- ❖ Fase 3: $v \propto \frac{1}{r_s^3}$

- ❖ Fase 2: $v \propto \frac{1}{r_s^{3/2}}$

- ❖ Fase 1: velocidade constante

15-34

Desaparecimento da SNR

- A SNR desaparece (=mistura-se ao MI) quando sua velocidade de expansão iguala-se à velocidade de dispersão do MI, que é da ordem de 10 km/s

- Nessa momento

- ❖ raio ~ 40 pc

- ❖ idade $\sim 1.000.000$ anos

- Uma SNR injeta algo como 3% da sua energia no MI em forma de energia cinética

15-35

Cygnus Loop
= Veil Nebula

Diámetro: 6 graus

SN na fase radiativa

<http://antwtrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap100916.html>

15-38